

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

EDITION BAS-VIVARAIS

ABONNEMENT ANNUEL : 100 f

REGISSEUR RECETTES D.R.A.F.



RÉGION RHÔNE-ALPES 55, rue Mazenod 69426 LYON CÉDEX 03

10 Octobre 1985

N° de série continue 108

Bulletin n° 22

- P. 1 : CERISIER - PECHER : Bactérioses, maladie criblée
P. 1 : POIRIER : Psylles traitement d'automne : c'est trop tôt
P. 2 : POMMIER : Tordeuse Orientale : fin des risques
Maladies de conservation, Tavelure : attention aux variétés tardives
P. 2 : POIRIER - POMMIER : Tavelures et chancres à Nectria : Traitements d'automne

ARBRES FRUITIERS

CERISIER

Bactérioses - Toujours d'actualité

Dans les vergers à protéger, vous avez déjà dû réaliser 2 traitements. Le 3ème est à prévoir entre le 18 et le 22 octobre.

Maladie criblée (Corynéum) - En présence de taches intervenez dès réception

La maladie se manifeste par des taches arrondies rouge lie de vin, évoluant en criblures sur les feuilles, en petits chancres gommeux sur les rameaux.

Intervention au tiers de la chute des feuilles avec une bouillie dosée à 200 g de cuivre métal par hl.

PECHER

Dépérissement Bactérien - 3ème traitement au plus tard au milieu de la semaine prochaine

Maladie criblée (Corynéum) - Le programme de protection contre le Dépérissement Bactérien protège également du Corynéum.

POIRIER

Psylles - Pour l'intervention d'automne, attendez encore

Ce traitement vise les adultes avec un pyréthrinoloïde tout en préservant assez bien les auxiliaires.

Les larves âgées sont encore nombreuses dans les vergers. Rappelons qu'aucun produit n'est efficace sur ces larves brunes.

POMMIER

Tordeuse Orientale - La protection peut être interrompue à côté des pêchers
Depuis le début octobre, les captures diminuent régulièrement. Les variétés tardives (Granny Smith, etc...) ne nécessitent plus aucune protection insecticide.

Tavelure - Maladies de conservation - Redémarrages toujours possibles

En cas d'humectation prolongée (pluie, brouillard, rosée persistante) le danger subsiste pour les variétés tardives.

Les données de nos précédents Bulletins restent valables.

POIRIER - POMMIER

Tavelures - Des possibilités pour diminuer l'inoculum d'automne

Les taches sur feuille même si elles paraissent séchées, peuvent reprendre leur évolution dès qu'une humectation se prolonge.

Le but de cette intervention est de gêner la formation des périthèces, forme hivernante des Tavelures dans les feuilles mortes.

Mais en aucun cas elle ne permettra d'alléger la protection au cours du printemps prochain.

Date : après la récolte et au plus tard au tout début de la chute des feuilles.

Produits : 2 cas à considérer

- En verger infesté et/ou en conditions très favorables aux tavelures

BAYCOR 25 à 0,1 kg/hl ou RUBIGAN 4 à 0,1 l/hl

Ces produits contrarient la formation des périthèces.

- En verger moyennement infesté

PERLUREE : 120 kgs dans au moins 1000 l d'eau pour 1 ha

. bien dissoudre l'urée juste avant le traitement

. ne mélanger avec aucun autre produit

. rincer abondamment votre appareil sitôt après le traitement

L'urée, en accélérant la décomposition des feuilles, empêche la formation des périthèces.

Remarques :

- En verger peu infesté et en l'absence de conditions favorables à la Tavelure, aucun traitement n'est nécessaire

- Dans tous les cas en présence de tavelure :

. éliminer et brûler les rameaux porteurs de chancres pustuleux (poirier)

. enfouir les feuilles mortes par un travail du sol

- La sécheresse a avancé la chute des feuilles dans certains vergers

- En cas d'utilisation cet automne de BAYCOR ou RUBIGAN il faudra limiter l'emploi de ces produits au cours du printemps 1986 afin de diminuer les risques toujours possibles d'apparition de souches résistantes.

Chancres à Nectria - En verger atteint, traitez au cuivre

Dans les rares vergers contaminés, réalisez 2 à 3 interventions dosées à 500 g de cuivre métal par hl pendant la chute des feuilles.

De plus, pendant la taille :

- Eliminez et brûlez les rameaux atteints

- Curetez les chancres jusqu'aux tissus sains et badigeonnez-les d'une peinture anti septique.